

Prednisolondrank 1-5 mg/ml FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het geneesmiddel gaat gebruiken.

- Als u nog vragen heeft, vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het geneesmiddel is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het geneesmiddel kan schadelijk zijn voor een ander.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is dit voor geneesmiddel en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Wat zijn mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van dit geneesmiddel?
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is dit voor geneesmiddel en waarvoor wordt het gebruikt?

Prednisolon is een bijnierschors hormonen, ook wel corticosteroïd genoemd. Natuurlijke bijnierschors hormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig voor het vrijmaken en opslaan van energie, mineralen en zouten.

Prednisolon wordt toegepast bij zeer veel aandoeningen, waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen. Prednisolon wordt gebruikt bij onder andere:

- Astma;
- Chronisch obstructieve longziekten;
- Reuma;
- Multiple sclerose (MS);
- Lupus erythematoses (LE);
- Bepaalde bloedziekten;
- De darmziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn;
- Allergische reacties;
- Lepra;
- Lichtovergevoeligheid.

Verder werkt het tegen sommige vormen van kanker en tegen de ernstige misselijkheid die kan ontstaan bij chemotherapie.

In combinatie met andere geneesmiddelen wordt het ook vaak toegepast bij het voorkomen van afstotingsreacties na orgaantransplantaties.

Ook wordt het gebruikt als substitutietherapie om een tekort aan lichaamseigen bijnierschors hormonen te vervangen, zoals bij de bijnierziekten de ziekte van Addison en ziekte van Cushing.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit geneesmiddel bij u is voorgeschreven.

De werking van prednisolon als onderdeel van behandeling tegen kanker is divers. Het verbetert de eetlust, vermindert vermoeidheid en zorgt er vaak voor dat u zich beter voelt. Verder gaat prednisolon de zwelling van tumoren tegen en kan daarom bij tumoren die tegen zenuwen aandrukken de pijn verminderen. Bij de ziekte van Kahler verlaagt prednisolon de hoeveelheid calcium in het bloed wat bij deze ziekte is verhoogd.

Veel medicijnen tegen kanker veroorzaken ernstige misselijkheid. Prednisolon kan deze vorm van misselijkheid verminderen. Vaak wordt het in combinatie met een ander middel tegen misselijkheid gebruikt, zoals metoclopramide, domperidon, ondansetron (Zofran) of granisetron (Kytrel).

Artsen schrijven het meestal voor als stootkuur. Een stootkuur is een behandeling van enkele dagen tot twee weken met een hoge dosering prednisolon. Meestal merkt u de werking binnen enkele uren. Soms is de stootkuur bedoeld om de periode te overbruggen tot u de werking merkt van een ander middel, waarvan het effect langzamer intreedt.

Een langdurige behandeling duurt enkele maanden of langer en bestaat uit een normale dosering prednisolon. Een langdurige behandeling wordt toegepast bij ernstige ziekten waarbij ontstekingsverschijnselen een rol spelen, waarbij andere geneesmiddelen niet of onvoldoende werken. Bij deze aandoeningen kan het enkele weken duren voor u het effect van prednisolon merkt.

Prednisolon wordt ook toegepast als substitutietherapie. Dat betekent dat men een tekort aan een lichaamseigen stof aanvult met een medicijn. In dit geval is dat bij een tekort aan het lichaamseigen bijnierschors hormoon prednisolon, zoals bij de ziekte van Addison, of de ziekte van Cushing.

Bij lepra (melaatsheid) vindt behandeling met een combinatie van antibiotica plaats. Opvlammingen van huid- en zenuwverschijnselen worden meestal behandeld met prednison of prednisolon.

2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

- Wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in onderdeel 6.
- Wanneer u allergisch bent voor soortgelijke middelen als prednisolon (corticosteroiden) of methylparahydroxybenzoaat (parabenen).
- Wanneer u een infectie heeft veroorzaakt door bacteriën, virussen (bijv. waterpokken), schimmels of een tropische worminfectie.
- Wanneer u slecht genezende wonden heeft.
- Wanneer u een maagzweer (ulcus ventriculi en ulcus duodeni) heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?

- Wanneer u een leverfunctiestoornis heeft, omdat prednisolon in de lever wordt gemetaboliseerd.
- Wanneer u lijdt aan systemische sclerose, omdat bij een dagdosering van 15 mg of meer een verhoogd risico is op (mogelijk fatale) renale crisis met hypertensie en verminderde urineproductie heeft. Bloeddruk en nierfunctie moeten bij deze patiënten daarom regelmatig worden gecontroleerd.
- Wanneer u diabetes mellitus heeft, omdat prednisolon de bloedglucoseconcentratie kunnen verhogen.
- Wanneer u glucocorticoïd geïnduceerde myopathie (in de voorgeschiedenis) heeft.
- Wanneer er sprake is van oculaire herpes, vanwege een mogelijke perforatie van de cornea.
- Wanneer u latente tuberculose heeft.
- Wanneer er sprake is van emotionele labiliteit.

- Wanneer u colitis ulcerosa met ook een dreigende perforatie of met een pyogene infectie (zoals een abces) heeft.
- Wanneer u diverticulitis heeft.
- Wanneer u een maagzweer (ulcus pepticum) (in de voorgeschiedenis) heeft.
- Wanneer er sprake is van hypertensie.
- Wanneer er sprake is van osteoporose.
- Wanneer er sprake is van myasthenia gravis.
- Wanneer u recent een myocardinfarct heeft doorgemaakt, vanwege het risico op een myocardruptuur.
- Wanneer u een parasitaire infectie met strongyloïdes (rondworm) heeft, vanwege het risico op hyperinfectie en uitzaaiing met een uitgebreide larvenverspreiding.

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast de prednisolon drank nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van dit geneesmiddel met:

- Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Deze pijnstillers hebben als bijwerking maag- en darmzweren. De kans hierop is groter als u ook prednisolon gebruikt. De pijnstiller paracetamol heeft deze bijwerking niet. Deze kunt u wel veilig gebruiken. Heeft u een ontstekingsremmende pijnstiller nodig? Overleg met uw arts of apotheker. Als u prednisolon gebruikt moet u vaak ook een maag beschermend middel slikken.
- Bepaalde vaccins, bijvoorbeeld bof-mazelen-rodehondvaccin (BMR-vaccin), rotavirusvaccin, varicellavaccin (tegen waterpokken) en BCG-vaccin (tegen tuberculose). Prednisolon vermindert de werkzaamheid van deze vaccins en kan de kans op bijwerkingen ervan verhogen. Als u prednisolon gebruikt als substitutietherapie is dit geen probleem. Maar als u prednisolon gebruikt voor andere aandoeningen kan uw lichaam onvoldoende reageren op deze vaccins waardoor u er ziek van kunt worden. Overleg hierover met uw arts.
- De antistollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Gebruikt u een hoge dosering van prednisolon? Dan kan de werking van het antistollingsmiddel toenemen. Overleg hierover met uw arts. Meld het aan de trombosedienst als u prednisolon gaat gebruiken en als u ermee stopt.
- Sommige medicijnen tegen hiv (virus waar u aids van kunt krijgen). Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
- Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.
- De volgende medicijnen verminderen de werking van prednisolon. Dit is van belang als u prednisolon langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Ook als u met een van deze medicijnen gaat stoppen.
 - De medicijnen tegen epilepsie: Carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
 - De medicijnen tegen tuberculose: Rifabutine en rifampicine.
 - Het kruidengeneesmiddel tegen depressieve klachten: Sint-janskruid (hypericum).

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en/of alcohol?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Een korte stootkuur kunt u soms volgen tijdens zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Overleg hierover met uw arts.

Over een behandeling van meerdere weken of langer zult u samen met uw arts een afweging moeten maken tussen de voordelen van de behandeling en de risico's voor het kind. De effecten op het ongeboren kind zijn nog niet allemaal bekend, maar duidelijk is dat het kind minder goed kan groeien.

Borstvoeding

Tijdens een stootkuur gedurende tien dagen met een dosering tot 30 mg per dag kunt u borstvoeding geven. Het geeft dan weinig risico voor de baby.

Tijdens een behandeling van meerdere weken of langer kunt u beter geen borstvoeding geven.

Overleg hierover met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe

- Schud de drank goed om voor gebruik.
- Meet de voorgeschreven hoeveelheid af met de door de apotheek meegegeven maatbeker, maatlepel of doseerspuit.
- Neem de drank in.

Wanneer dit is toegestaan, kunt u dit medicijn vlak voor of tijdens een maaltijd innemen. U heeft dan minder kans op maagklachten. Overleg hierover met uw arts.

Hoe vaak en wanneer

Zodra u het middel in huis heeft, kunt u het het beste meteen innemen.

Soms moet u dit middel in het begin twee tot vier keer per dag innemen, om er zo aan te wennen.

Zodra u minder last heeft van de bijwerkingen, zoals misselijkheid, kunt u proberen de hoeveelheid voor één dag in één keer in te nemen. U voorkomt hiermee bijwerkingen op de lange termijn.

Als u het één keer per dag inneemt, doe dat dan vroeg in de ochtend. Bijvoorbeeld bij het ontbijt. U beperkt hierdoor het remmende effect op de eigen bijnierschors.

Hoelang

Een stootkuur duurt meestal tussen de vijf en tien dagen. Soms moet u de dosis aan het einde van de kuur langzaam afbouwen.

Het kan ook nodig zijn dat u prednisolon voor langere tijd moet gebruiken. Soms wel enkele maanden of langer.

Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen?

Wanneer u te veel van de prednisolondrank heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit geneesmiddel in te nemen?

- Als u dit middel één keer per dag gebruikt: Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- Als u dit middel verschillende keren per dag gebruikt: neem de vergeten dosis zo snel mogelijk alsnog in. Is het alweer tijd voor de volgende dosis? Neem beide doses dan tegelijk in.
- Als u dit middel één keer in de twee dagen gebruikt: neem de vergeten dosis de volgende ochtend in. Komt u er pas na twee dagen achter als u de volgende dosis alweer moet innemen? Sla de vergeten dosis dan over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruiken van dit geneesmiddel

Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Bij ziektes waarbij het lichaam zelf geen of onvoldoende bijnierschors hormonen aanmaakt, zal de bijnierschors niet of nauwelijks meer op gang komen. U moet dit middel daarom levenslang gebruiken.

- Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel enkele dagen? Dan kunt u in één keer stoppen zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan.
- Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel korter dan 3 weken achter elkaar? Meestal kunt u in één keer stoppen, zonder dat er ontwenningsverschijnselen ontstaan. Soms heeft de arts voor u wel een afbouwschema voorgesteld. Vaak is dat om een terugkeer van de aandoening te voorkomen. Bij astma stapt u soms over op inhalaties met een bijnierschors hormoon.
- Mag u wel stoppen? En gebruikt u dit middel langer dan 3 weken achter elkaar? Bouw dan langzaam af in overleg met uw arts. Bij plotseling stoppen kunt u last krijgen van ernstige ziekteverschijnselen, zoals diarree, misselijkheid, zwakte en vermoeidheid. Die ziekteverschijnselen ontstaan doordat tijdens het gebruik uw eigen bijnierschors minder hormonen aanmaakt. Er is immers al voldoende bijnierschors hormoon in het lichaam aanwezig. Bij plotseling stoppen kan de bijnierschors de hormonen niet ineens weer aanmaken. Het duurt enige weken tot soms meer dan een jaar voor de bijnierschors weer helemaal op gang is.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals bij elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, maar dit hoeft niet bij iedereen voor te komen.

De beschrijving van hoe vaak een bijwerking is gemeld is als volgt:

- Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)
- Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)
- Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

De kans op deze bijwerkingen hangt af van uw eigen gevoeligheid voor dit medicijn, de hoeveelheid prednisolon die u gebruikt en de duur van de behandeling:

- Bij een stootkuur (enkele dagen tot weken een dosering prednisolon van 30 mg tot 80 mg per dag): De bijwerkingen zijn soms lastig of vervelend, maar meestal niet gevaarlijk of schadelijk.
- Als u vaker per jaar een stootkuur nodig heeft, of meerdere weken tot maanden (een lage dosering) prednisolon gebruikt: De meeste lastige of vervelende bijwerkingen gaan over als u aan het middel gewend bent geraakt. Dat is na enkele dagen tot weken.
Na enkele weken gebruik of veel stootkuren heeft u wel een kleine kans op andere ernstigere bijwerkingen. Hoe korter u dit medicijn gebruikt en hoe lager de dosering, hoe minder kans u heeft op deze bijwerkingen.

Bijwerkingen die u meteen vanaf het begin kunt krijgen:

Zelden

- Maag- of darmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, opkomend maagzuur, een opgezette buik, diarree of verstopping. Als u dit medicijn vlak voor of tijdens de maaltijd inneemt, kunt u deze klachten meestal voorkomen.
- Meer kans op infecties met bacteriën, virussen of schimmels. Overleg voor gebruik met uw arts als u een infectie heeft, zoals tuberculose. Dat is nodig omdat sluimerende infecties door dit medicijn erger kunnen worden. Bovendien heeft u het minder snel in de gaten als een infectie uit de hand loopt. Dit medicijn vermindert namelijk de verschijnselen van een ontsteking, zoals roodheid en zwelling.
Neem in elk geval contact op met uw arts bij:
 - een ontsteking die opeens opkomt;
 - ontstekingen in of rond uw ogen;
 - ontstekingen waarvan u weet of vermoedt dat deze door een virus zijn veroorzaakt, zoals gordelroos. Hierbij heeft u vlekken en blaasjes op uw huid met jeuk en pijn;
 - als in uw omgeving mazelen of waterpokken heerst;
 - als u een wond heeft die slecht geneest;
 - als u gevaccineerd moet worden, bijvoorbeeld tegen tropische ziekten. Mogelijk reageert uw lichaam onvoldoende op de inenting.
- Hoofdpijn en duizeligheid.
- Spierklachten, zoals spierzwakte, snel vermoeid, spierpijn, trillende handen en spierkrampen in handen, voeten en benen. Dit kan na stoppen nog lang aanhouden. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen hier extra last van hebben. Raadpleeg uw arts als uw klachten verergeren.
- Veranderingen in gevoel en stemming, Dit kan per persoon verschillen. U kunt energiever, prikkelbaar, rusteloos, angstig of agressief worden, maar ook neerslachtig, futloos of vermoeid.
Heeft u veel last van deze stemmingsveranderingen? Praat erover met uw arts. Mogelijk moet de dosering iets lager.
Heeft u slaapproblemen door de rusteloosheid? Het kan helpen prednisolon in één keer vroeg op de dag in te nemen. Overleg hierover met uw arts.
Bent u depressief of wordt u hiervoor behandeld? Overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken.
- Verschijnselen van diabetes (suikerziekte). U merkt dit aan veel dorst en veel plassen. Dit komt vooral voor bij mensen boven de 75 jaar.
Heeft u diabetes? Mogelijk heeft u tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig. Meet extra vaak uw bloedsuiker.
- Vochtophoping (oedeem). Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.
Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door een hart wat minder goed pompt

(hartfalen) zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u hartfalen of oedeem heeft.

- Stoornissen in uw hartritme. Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

Zeer zelden

- Maagzweer of darmzweer. Dit medicijn kan een maagzweer verergeren. Overleg voor gebruik met uw arts of apotheker als u een maag- of darmzweer heeft of kortgeleden heeft gehad. Misschien heeft u een maagbeschermer nodig. Raadpleeg uw arts als uw maagklachten verergeren.
- Een te hoge bloeddruk. Het treedt vooral op bij doseringen van meer dan 7,5 mg per dag bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Overleg voor gebruik met uw arts als u een hoge bloeddruk heeft of hiervoor behandeld wordt. Uw bloeddruk moet vaker gecontroleerd.
- Ernstige psychische klachten, zoals overdreven opgewekt gevoel, impulsief gedrag en in de war zijn (verwardheid). Ook kunt dingen gaan geloven of denken die niet kloppen (wanen) of dingen gaan zien, horen of voelen die er niet zijn (hallucinaties). Overleg bij deze verschijnselen met uw arts.
- De hik. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige allergie (met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel, verlies van het bewustzijn). Ga dan onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor prednisolon. Het apothekerteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
- Een trage hartslag.

U kunt hier vooral last van hebben als u een hoge dosering gebruikt.

Als u prednisolon meer dan 3 weken achtereen gebruikt of meerdere stootkuren per jaar nodig heeft: u heeft meer kans op onderstaande bijwerkingen. Ze treden soms pas na maanden op, of pas als u al bent gestopt. Gebruikt u minder dan 7,5 mg per dag? Dan heeft u weinig kans op deze bijwerkingen.

Soms

- Zwaarder worden en een andere vetverdeling. Dit komt door een andere opbouw en afbraak van vet, meer eetlust en vasthouden van vocht. Vet gaat vooral zitten op de buik en op de bovenkant van de rug. Het is vaak nodig uw eetgewoontes aan te passen om uw gewicht op peil te houden. Een diëtist kan u daarbij helpen.
- Dik gezicht (bolle wangen). Net als de gewichtstoename is dit voor velen een belangrijk nadeel van de behandeling. Het gaat niet goed met u, maar voor uw omgeving ziet u er juist 'welvarend' uit. Het verdwijnt weer als u stopt met het medicijn.

Zelden

- Dunnere huid, waardoor u sneller blauwe plekken heeft en streepvormige littekens (striae). Enige maanden na het stoppen met de behandeling heeft de huid meestal weer zijn normale dikte terug. De littekens verdwijnen niet meer.
- Rood geaderde of rode huid in het gezicht en puntvormige huidbloedinkjes.
- Verminderde werking van de bijnierschors. Vooral kinderen zijn gevoelig voor deze bijwerking. Hier heeft u tijdens de behandeling geen last van, maar na het stoppen heeft uw bijnierschors tijd nodig om op gang te komen om weer zelf bijnienschors hormonen aan te maken. Dit kan meerdere maanden duren.

- Groeivertraging bij kinderen. Het is belangrijk dat een arts regelmatig de lichaamslengte en het lichaamsgewicht controleert. Als blijkt dat het kind te weinig groeit, kan de arts adviseren dit medicijn niet elke dag, maar elke 2 dagen te nemen. Dit herstelt de groei.
- Botontkalking (osteoporose), waardoor deze eerder breken. Het is belangrijk tijdens het gebruik van dit medicijn voldoende kalk te gebruiken (in de vorm van zuivelproducten of eventueel als tabletten). Ook lichaamsbeweging is nodig, omdat dat zorgt voor een actieve opbouw van de botten. In veel gevallen zal de arts u adviseren ook medicijnen tegen botontkalking te gebruiken.
- Te weinig kalium in het bloed. Dit merkt u onder andere aan spierkrampen, spiertrekkingen, spierpijn, spierzwakte, minder eetlust, verstopping en hartkloppingen of een overslaand hart. Neem bij een of meer van deze klachten contact op met uw arts.
- Te veel cholesterol in het bloed, na meerdere maanden gebruik. Hierdoor heeft u meer kans op hart- of vaatziekten. Uw arts kan medicijnen voorschrijven om de hoeveelheid cholesterol in uw bloed te verlagen.
- Staar (een blijvende vertroebeling van de ooglenzen: cataract). Neem contact op met uw arts als u slechter, wazig of dubbelziet. Staar komt meestal alleen voor bij gebruik gedurende meerdere jaren.
- Glaucoom is een soort staar waarbij uw oogboldruk meestal te hoog is. Overleg met uw arts als u weet dat u glaucoom heeft, terwijl u daar niet voor wordt behandeld. Waarschuw uw arts als u minder goed gaat zien of als u hevige pijn achter uw oog heeft die niet binnen enkele uren wegtrekt. Glaucoom komt meestal alleen voor bij gebruik gedurende meerdere jaren.

Zeer zelden

- Huidklachten, zoals slecht genezende wonden, acne (jeugdpuistjes), veel transpireren, meer lichaamsbeharig (vooral in het gezicht) en donkere of juist lichte plekken op de huid.
- Peesontsteking en makkelijker scheuren van pezen, vooral van de achillespees.
- Erectiestoornissen
- Bij vrouwen: wegblijven van de menstruatie tijdens de behandeling.
- Ernstige hartvaatziekte, zoals door een hart dat minder goed pompt (hartfalen), een hartaanval of een beroerte. Hier is meestal pas kans op na meerdere maanden gebruik.

Melden van bijwerkingen

Als u last krijgt van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Ook wanneer u last krijgt van mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl).

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Bewaar de drank beneden 25 °C, niet in de koelkast of vriezer. Sluit de fles na gebruik goed af, dit voorkomt bederf.

In een onaangebroken verpakking is de drank houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat. Na aanbreken van de verpakking is de drank maximaal 6 maanden houdbaar, maar niet langer dan de uiterste gebruiksdatum die op het etiket staat.

Bewaar uw geneesmiddelen buiten het zicht en buiten bereik van kinderen.

Gooi uw geneesmiddelen niet in de vuilnisbak of spoel ze niet weg door de WC of de gootsteen, maar lever deze in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

De werkzame stof in dit geneesmiddel is prednisolondinatriumfosfaat, overeenkomend met 1-5 mg prednisolondinatriumfosfaat per ml.

De hulpstoffen die in dit geneesmiddel aanwezig zijn, zijn sorbitol, methylparabeenoplossing (wat bestaat uit methylparahydroxybenzoaat en propyleenglycol), bananenessence, dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, dinatriumwaterstoffosfaat-dodecahydraat en gezuiverd water.

Hoe ziet het geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De prednisolon drank is helder en kleurloos. De drank is per 100 ml verpakt in een ondoorschijnende fles.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak c.v.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in februari 2025 door SaVemaak C.V.