

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Carbidopa capsule 25-50 mg niet FNA

Lees onderstaande informatie goed door voordat u het medicijn gaat gebruiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Vraag dan de arts of apotheker om uitleg.
- Het medicijn is enkel voor u voorgeschreven. Geef dit medicijn niet door aan anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Het medicijn kan schadelijk zijn voor een ander.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van de bijsluiter

1. Wat is Carbidopa capsule 25-50 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Carbidopa capsule 25-50 mg niet FNA en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit medicijn bevat carbidopa. Carbidopa behoort tot een groep medicijnen die 'therapeutische hulpstoffen bij levodopa' worden genoemd. Carbidopa wordt altijd samen gegeven met levodopa. Dit is een medicijn dat lijkt op dopamine, een stof die in de hersenen voorkomt. Als er te weinig dopamine is, zoals bij de ziekte van Parkinson, vult levodopa dit tekort aan dopamine aan. Carbidopa remt de afbraak van levodopa. Dit zorgt ervoor dat levodopa sterker en langer werkt.

Carbidopa capsule 25-50 mg wordt gebruikt bij:

- Ziekte van Parkinson, samen met levodopa.

Heeft u een ander ziektebeeld? Vraag dan uw arts waarom dit medicijn bij u is voorgeschreven.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit medicijn zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

- U bent jonger dan 18 jaar

Gebruikt u dit medicijn samen met levodopa? Dan mag u dit medicijn ook niet gebruiken:

- Als u verhoogde oogboldruk (nauwe-kamerhoekglaucoom) heeft.
- Als u ernstig hartfalen heeft.
- Als u ernstige hartritmestoornissen heeft.
- Als u een beroerte krijgt.
- Als u geen medicijnen mag gebruiken die werken op het centrale zenuwstelsel.
- Als u verdachte moedervlekken (melanoom) heeft.
- Als u niet-selectieve MAO-remmers (monoamineoxidaseremmers) en selectieve MAO-remmers type A gebruikt. Bijvoorbeeld tranylcypromine en moclobemide. Dit zijn medicijnen die tegen depressie worden gebruikt. U moet minstens 2 weken voor het starten met levodopa/carbidopa stoppen met deze medicijnen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Gebruikt u dit medicijn samen met levodopa? Dan moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn:

- Als u in het verleden een psychose heeft gehad.
- Als u een ernstige aandoening heeft van hart en bloedvaten.
- Als u een ernstige longziekte heeft.
- Als u een nier- of leveraandoening heeft.
- Als u een maagzweer of darmzweer heeft gehad. Dit medicijn kan de kans op maagbloedingen verhogen.
- Als u bloed braakt.
- Als u eerder toevallen/stuipen (convulsies) heeft gehad.
- Als u kortgeleden een hartaanval heeft gehad.
- Als u een erfelijke ziekte heeft waardoor u plotseling en onwillekeurig beweegt (chorea van Huntington).

Neem in deze gevallen contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Neem contact op met uw arts wanneer u of uw familie/omgeving merkt dat u de neiging heeft om gedrag te vertonen dat niet bij u past. Of wanneer u de aandrang of verleiding niet kunt weerstaan om dingen te doen die u of anderen beschadigen.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Carbidopa capsule 25-50 mg niet FNA nog andere medicijnen, heeft u dat kortgeleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Carbidopa heeft geen invloed op andere medicijnen.

Carbidopa wordt samen gebruikt met levodopa. Levodopa heeft wel invloed op andere medicijnen. Dit noemen we een wisselwerking. Hierdoor werken medicijn beter, slechter of anders. De belangrijkste wisselwerkingen van levodopa zijn met:

- Medicijnen tegen wanen en hallucinaties (antipsychotica). Deze zorgen ervoor dat levodopa minder goed werkt.
- Medicijnen tegen misselijkheid en overgeven (alizapride, droperidol, metoclopramide). Deze zorgen ervoor dat levodopa minder goed werkt.
- Ijzerproducten (ferrofumaraat, ferrogluconaat, ferrosulfaat, ferrochloride). Deze mag u niet tegelijk innemen met levodopa/carbidopa. Neem het ijzerproduct 2 uur na levodopa/carbidopa in.
- Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Op de verpakking van deze medicijnen is een gele waarschuwingsticker geplakt.

Heeft u vragen over of een van deze wisselwerkingen voor u belangrijk zijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Gebruik liever geen alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol verhoogt de kans dat u plotseling in slaap valt of suf wordt. Ook verhoogt alcohol de kans op maagklachten en duizelig zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Borstvoeding

Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Daarna mag het alleen als u bijvoorbeeld geen last heeft van duizelig zijn, verward zijn of slaperig zijn.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wijze van gebruik

Neem de capsules in met een half glas water.

Gebruikt u dit medicijn samen met levodopa? Neem de capsule dan in op een lege maag (30 minuten voor het eten of 1 uur na het eten) met water, niet met melkproducten.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Als u te veel van dit medicijn heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

- Als u dit medicijn 2 keer op een dag gebruikt:
 - Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
 - Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
- Als u dit medicijn 3 keer op een dag gebruikt:
 - Duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
 - Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
- Als u dit medicijn 4 keer op een dag of vaker gebruikt:
 - Duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
 - Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u stopt met het gebruiken van dit medicijn

Overleg altijd met uw arts als u eerder wilt stoppen met dit medicijn dan wat de arts heeft aangegeven.

Stop niet in 1 keer. U kunt dan last krijgen van:

- Koorts
- Zeer stijve spieren
- Suf zijn
- Hartkloppingen
- Ernstig zweten

Stop daarom alleen na overleg met uw arts. Bouw de dosering tijdens een week langzaam af. Neem direct contact op met uw arts als u deze verschijnselen krijgt na het stoppen of tijdens het afbouwen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Als dit medicijn samen met levodopa wordt gebruikt, kunnen mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Duizeligheid
- Droge mond
- Hartkloppingen

- Maag-darmklachten zoals misselijkheid, verstopping, diarree en gebrek aan eetlust. Vooral als u begint met dit medicijn.
- Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties) en in de war zijn.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

- Hoofdpijn, wazig zien, moe zijn.
- Depressie, slapeloosheid, nachtmerries.
- Plas, zweet en speeksel kunnen een donkere kleur krijgen.
- Slaperigheid overdag of plotseling in slaap vallen.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Opwinding
- Angst
- Verminderd denkvermogen
- Toegenomen seksuele verlangens
- Meer kans op verslaving, zoals te veel kopen, gokken of medicijngebruik.
- Gevoelloosheid
- Epileptische aanvallen/stuipen
- Bloedarmoede en bloedafwijkingen
- Haaruitval

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- Zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt zelf ook bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de huiskamer of slaapkamer.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Sluit de pot na gebruik goed af. Dit voorkomt dat de capsules vochtig worden.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Lever de medicijnen in bij uw apotheek. Via de apotheek worden ze op de juiste manier vernietigd, waardoor ze niet in het milieu terechtkomen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is carbidopa. Dit is aanwezig in de vorm van carbidopa micronisatum, overeenkomend met 25-50 mg carbidopa.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit medicijn zijn primojel capsulevulmengsel en colloïdaal watervrij silica (Aerosil 200V).

Hoe ziet het medicijn eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dit medicijn is wit van kleur. De capsules zijn per 100 stuks verpakt in een pot.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant:

Savemaak C.V.
Vilstersestraat 33
8152 AA Lemelerveld

Neem voor alle informatie over dit medicijn contact op met uw apotheek of kijk op www.BijsluiterPlus.nl .

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in november 2023 door SaVeMaak C.V.